



Catálogo de autoridades taxonómicas de los reptiles (Reptilia: Chordata) de México

Forma de citar: CONABIO (comp.). 2009. Catálogo de autoridades taxonómicas de los reptiles (Reptilia: Chordata) de México. Base de datos SNIB-CONABIO. México.
Incluye información del proyecto CS003.

Reino Animalia Linnaeus, 1758

Phylum Chordata Bateson, 1885

Subphylum Vertebrata Cuvier, 1812

Clase Reptilia Laurenti, 1768

Orden Crocodylia Owen, 1842

Familia Alligatoridae Gray, 1844

géneros: 1, especies: 1

Género *Caiman* Gray 1844

C. crocodylus (Linnaeus, 1758)

Familia Crocodylidae Gray, 1825

géneros: 1, especies: 2

Género *Crocodylus* Laurenti, 1768

C. acutus (Cuvier, 1807)

C. moreletii (Duméril & Duméril, 1851)

Orden Squamata Oppel, 1811

Familia Anguillidae Cope, 1864

géneros: 7, especies: 47

Género *Abronia* Gray, 1838

A. bogerti Tihen, 1954

A. chiszari Smith & Smith, 1981

A. deppii (Wiegmann, 1828)

A. fuscolabialis (Tihen, 1944)

A. graminea (Cope, 1864)

A. leurolepis Campbell & Frost, 1993

A. lythrochila Smith & Alvarez del Toro, 1963

A. martindelcampoi Flores-Villela & Sánchez-H., 2003

A. matudai (Hartweg & Tihen, 1946)

A. mitchelli Campbell, 1982

A. mixteca Bogert & Porter, 1967

A. oaxacae (Günther, 1885)

A. ochoterenai (Martín del Campo, 1939)

A. ornelasi Campbell, 1984

A. ramirezi Campbell, 1994

A. reidi Werler & Shannon, 1961

A. smithi Campbell & Frost, 1993

A. taeniata (Wiegmann, 1828)

Género *Barisia* Gray, 1838

B. ciliaris Smith, 1942

B. herrerae Zaldivar-Riverón & Nieto-Montes de Oca, 2002

B. imbricata (Wiegmann, 1828)

B. jonesi Guillella & Smith, 1982

B. levicollis Stejneger, 1890

B. planifrons Bocourt, 1878

B. rudicollis (Wiegmann, 1828)

Género *Celestus* Gray 1838

C. enneagrammus (Cope, 1860)

C. legnotus (Campbell & Camarillo, 1994)

- C. rozellae** Smith, 1942
 Género *Elgaria* Gray, 1838
E. cedrosensis Fitch, 1934
E. kingi Gray, 1838
E. multicarinata (Blainville, 1835)
E. nana Fitch, 1934
E. parva (Knight & Scudday, 1985)
E. paucicarinata (Fitch, 1934)
E. usafa Smith, Lemos-Espinal & Ingrasci, 2003
E. velazquezi Grismer & Hollingsworth, 2001
 Género *Gerrhonotus* Wiegmann, 1828
G. infernalis Baird, 1859
G. liocephalus Wiegmann, 1828
G. lugoii McCoy, 1970
G. ophiurus (Cope, 1867)
 Género *Mesaspis* Cope, 1877
M. antauges (Cope, 1866)
M. gadovii (Boulenger, 1913)
M. juarezi (Karges & Wright, 1987)
M. moreleti (Bocourt, 1871)
M. viridiflava (Bocourt, 1873)
 Familia *Anniellidae* Boulenger, 1885 géneros: 1, especies: 2
 Género *Anniella* Gray, 1852
A. geronimensis Shaw, 1940
A. pulchra Gray, 1852
 Familia *Corytophanidae* Fitzinger, 1843 géneros: 3, especies: 6
 Género *Basiliscus* Laurenti, 1768
B. vittatus Wiegmann, 1828
 Género *Corytophanes* Boie in Schlegel, 1826
C. cristatus (Merrem, 1821)
C. hernandezi (Wiegmann, 1831)
C. percarinatus Duméril, 1856
 Género *Laemanctus* Wiegmann, 1834
L. longipes Wiegmann, 1834
L. serratus Cope, 1864
 Familia *Crotaphytidae* Smith & Brodie, 1982 géneros: 2, especies: 10
 Género *Crotaphytus* Holbrook, 1842
C. antiquus Axtell & Webb, 1995
C. collaris (Say en James, 1823)
C. dickersonae Schmidt, 1922
C. grismeri McGuire, 1994
C. insularis Van Denburgh & Slevin, 1921
C. nebrius Axtell & Montanucci, 1977
C. reticulatus Baird, 1858
C. vestigium Smith & Tanner, 1972
 Género *Gambelia* Baird, 1859
G. copeii Yarrow, 1882
G. wislizenii (Baird & Girard, 1852)
 Familia *Dibamidae* Boulenger, 1884 géneros: 1, especies:
 Género *Anguis* Linnaeus, 1758
A. ceroni Holman, 1965
A. incomptus McConkey, 1955
 Familia *Eublepharidae* (Grismer, 1988) géneros: 1, especies: 7
 Género *Coleonyx* Gray, 1845

- C. brevis* Stejneger, 1893
C. elegans Gray, 1845
C. fasciatus (Boulenger, 1885)
C. gypsicolus Grismer & Ottley, 1988
C. reticulatus Davis & Dixon, 1958
C. switaki (Murphy, 1974)
C. variegatus (Baird, 1858)
C. variegatus subsp. *abbotti* Klauber, 1945
C. variegatus subsp. *peninsularis* Klauber, 1945
C. variegatus subsp. *sonoriensis* Klauber, 1945
- Familia Gekkonidae Stejneger, 1907 géneros: 7, especies: 24
- Género *Aristelliger* Cope, 1861
A. georgeensis (Bocourt, 1873)
- Género *Gehyra* Gray, 1834
G. mutilata (Wiegmann, 1835)
- Género *Gonatodes* Fitzinger, 1843
G. albogularis (Duméril & Bribon, 1836)
- Género *Hemidactylus* Gray, 1825
H. frenatus Schlegel, 1836
H. mabouia (Moreau de Jonnés, 1818)
H. turcicus (Linnaeus, 1758)
- Género *Phyllodactylus* Gray, 1828
P. bordai Taylor, 1942
P. bugastrolepis Dixon, 1966
P. davisii Dixon, 1964
P. delcampoi Mosauer, 1936
P. duellmani Dixon, 1960
P. homolepidurus Smith, 1935
P. lanei Smith, 1935
P. muralis Taylor, 1940
P. nocticolus Dixon, 1964
P. partidus Dixon, 1966
P. paucituberculatus Dixon, 1960
P. tuberculatus Wiegmann, 1834
P. unctus (Cope, 1863)
P. xanti (Cope, 1863)
- Género *Sphaerodactylus* Wagler, 1830
S. argus Gosse, 1850
S. glaucus Cope, 1865
S. millepunctatus Hallowell, 1861
- Género *Thecadactylus* Goldfuss, 1820
T. rapicaudus (Houttuyn, 1782)
- Familia Gymnophthalmidae géneros: 1, especies: 1
- Género *Gymnophthalmus* Merrem, 1820
G. speciosus (Hallowell, 1861)
- Familia Helodermatidae Gray, 1837 géneros: 1, especies: 2
- Género *Heloderma* Wiegmann, 1829
H. horridum (Wiegmann, 1829)
H. suspectum Cope, 1869
- Familia Iguanidae Oppel, 1811 géneros: 4, especies: 20
- Género *Ctenosaura* Wiegmann, 1828
C. acanthura (Shaw, 1802)
C. alfredschmidti Köhler, 1995
C. clarki (Bailey, 1928)

- C. conspicuosa* Lowe & Norris, 1955
C. defensor Cope, 1866
C. hemilopha (Cope, 1863)
C. macrolopha Smith, 1972
C. nolascensis Smith, 1972
C. oaxacana Köhler & Hasbun, 2001
 Sinónimos
Ctenosaura quinquecarinata (Gray, 1842)
C. pectinata (Wiegmann, 1834)
C. similis (Gray, 1831)
 Género *Dipsosaurus* Hallowell, 1854
D. catalinensis Van Denburgh, 1922
D. dorsalis (Baird & Girard, 1852)
D. dorsalis subsp. *dorsalis* (Baird & Girard, 1852)
D. dorsalis subsp. *lucasensis* Van Denburgh, 1920
 Género *Iguana* Laurenti, 1768
I. iguana (Linnaeus, 1758)
 Género *Sauromalus* Duméril, 1856
S. ater Duméril, 1856
S. hispidus Stejneger, 1891
S. klauberi Shaw, 1941
S. obsus (Baird, 1859)
S. slevini Van Denburgh, 1922
S. varius Dickerson, 1919
 Familia Phrynosomatidae Blainville, 1835
 Género *Callisaurus* Blainville, 1835
C. draconoides Blainville, 1835
C. draconoides subsp. *carmenensis* Dickerson, 1919
C. draconoides subsp. *draconoides* Blainville, 1835
C. draconoides subsp. *inusitatus* Dickerson, 1919
 Género *Cophosaurus* Troschel, 1852
C. texanus Troschel, 1852
 Género *Holbrookia* Girard, 1851
H. approximans Baird, 1858
H. lacerata Cope, 1880
H. maculata Girard, 1851
H. propinqua Baird & Girard, 1852
 Género *Petrosaurus* Boulenger, 1885
P. mearnsi (Stejneger, 1894)
P. repens Van Denburgh, 1895
P. slevini Van Denburgh, 1922
P. thalassinus (Cope, 1863)
 Género *Phrynosoma* Wiegmann, 1828
P. asio Cope, 1864
P. braconnieri Duméril & Bocourt, 1870
P. cornutum (Harlan, 1825)
P. coronatum (Blainville, 1835)
P. ditmarsii Stejneger, 1906
P. douglasii (Bell, 1829)
P. hernandesi Girard, 1858
P. mcallii (Hallowell, 1852)
P. modestum Girard, 1852
P. orbiculare (Linnaeus, 1789)
P. platyrhinos Girard, 1852

géneros: 9, especies: 126

P. solare Gray, 1845

P. taurus Dugès, 1868

Género *Sceloporus* Wiegmann, 1828

S. acanthinus Bocourt, 1873

S. adleri Smith & Savitzky, 1974

S. aeneus Wiegmann, 1828

S. anahuacus Lara-Góngora, 1983

S. angustus (Dickerson, 1919)

S. asper Boulenger, 1897

S. bicanthalis Smith, 1937

S. bulleri Boulenger, 1894

S. carinatus Smith, 1936

S. cautus Smith, 1938

S. chaneyi Liner & Dixon, 1992

S. chrysostictus Cope, 1866

S. clarkii Baird & Girard, 1852

S. couchi Baird, 1859

S. cowlesi Lowe & Norris, 1956

Sinónimos

Sceloporus edbelli Smith, Chiszar & Lemos-Espinal, 2002

S. cozumelae Jones, 1927

S. cryptus Smith & Lynch, 1967

S. dugesii Bocourt, 1873

S. edwardtaylori Smith, 1936

S. exsul Dixon, Ketchersid & Lieb, 1972

S. formosus Wiegmann, 1834

S. gadoviae Boulenger, 1905

S. goldmani Smith, 1937

S. graciosus Baird & Girard, 1852

S. grammicus Wiegmann, 1828

S. grandaevus (Dickerson, 1919)

S. halli Dasman & Smith, 1974

S. heterolepis Boulenger, 1894

S. horridus Wiegmann, 1834

S. hunsakeri Hall & Smith, 1979

S. insignis Webb, 1967

S. internasalis Smith & Bumzahem, 1955

S. jalapae Günther, 1890

S. jarrovii Cope, 1875

S. jarrovii subsp. *cyanostictus* Axtell & Axtell, 1971

S. lemosespinalis Lara-Góngora, 2003

S. licki Van Denburgh, 1895

S. lineatulus Dickerson, 1919

S. lundelli Smith, 1939

S. maccougalli Smith & Bumzahem, 1953

S. maculosus Smith, 1934

S. magister Hallowell, 1854

S. marmoratus Hallowell, 1852

S. megalepidurus Smith, 1934

S. melanorhinus Bocourt, 1876

S. merriami Stejneger, 1904

S. minor Cope, 1885

S. mucronatus Cope, 1885

S. nelsoni Cochran, 1923

- S. oberon* Smith & Brown, 1941
S. occidentalis Baird & Girard, 1852
S. ochoterenae Smith, 1934
S. olivaceus Smith, 1934
S. olloporus Smith, 1937
S. orcutti Stejneger, 1893
S. ornatus Baird, 1859
S. palaciosi Lara-Góngora, 1983
S. parvus Smith, 1934
S. poinsetti Baird & Girard, 1852
S. pyrocephalus Cope, 1864
S. salvini Günther, 1890
S. samcolemani Smith & Hall, 1974
S. scalaris Wiegmann, 1828
S. serrifer Cope, 1866
S. siniferus Cope, 1869
S. slevini Smith, 1937
S. smaragdinus Bocourt, 1873
S. smithi Hartweg & Oliver, 1937
S. spinosus Wiegmann, 1828
S. squamosus Bocourt, 1874
S. stejnegeri Smith, 1942
S. subpictus Lynch & Smith, 1965
S. sugillatus Smith, 1942
S. taeniocnemis Cope, 1885
S. tanneri Smith & Larsen, 1975
S. teapensis Günther, 1890
S. torquatus Wiegmann, 1828
S. undulatus Bosc & Daudin en Sonnini & Latreille, 1801
S. utiformis Cope, 1864
S. vandenburgianus Cope, 1896
S. variabilis Wiegmann, 1834
S. virgatus Smith, 1938
S. zosteromus Cope, 1863
- Género *Uma* Baird, 1858
- U. exsul* Schmidt & Bogert, 1947
U. notata Baird, 1858
U. paraphygas Williams, Chrapliwy & Smith, 1959
U. rufopunctata Cope, 1895
- Género *Urosaurus* Hallowell, 1854
- U. auriculatus* (Cope, 1871)
U. bicarinatus (Duméril, 1856)
U. clarionensis (Townsend, 1890)
U. gadovi (Schmidt, 1921)
U. graciosus Hallowell, 1854
U. lahtelai Rau & Loomis, 1977
U. nigricaudus (Cope, 1864)
U. ornatus (Baird & Girard, 1852)
- Género *Uta* Baird & Girard, 1852
- U. concinna* Dickerson, 1919
U. encantadae Grismer, 1994
U. lowei Grismer, 1994
U. mannophora Dickerson, 1919
U. nolascensis Van Denburgh & Slevin, 1921

U. palmeri Stejneger, 1890
U. squamata Dickerson, 1919
U. stansburiana Baird & Girard, 1852
U. tumidarostra Grismer, 1994

Familia Polychridae

géneros: 1, especies: 52

Género *Anolis* Daudin, 1802

A. adleri Smith, 1972
A. allisoni Barbour, 1828
A. alvarezdeltoroi Nieto-Montes de Oca, 1996
A. anisolepis Smith, Burley & Fritts, 1968
A. baccatus Bocourt, 1873
A. barkeri Schmidt, 1939
A. biporcatus (Wiegmann, 1834)
A. breedlovei Smith & Paulson, 1968
A. capito Peters, 1863
A. carolinensis Voigt, 1832
A. compressicauda Smith & Kerster, 1955
A. crassulus Cope, 1864
A. cumingii Peters, 1863
A. cuprinus Smith, 1964
A. cymbops Cope, 1864
A. dollfusianus Bocourt, 1873
A. duellmani Fitch & Henderson, 1973
A. dunni Smith, 1936
A. forbesi Smith & Van Gelder, 1955
A. gadovii Boulenger, 1905
A. hobartsmithi Nieto-Montes de Oca, 2001
A. isthmicus Fitch, 1978
A. laeviventris (Wiegmann, 1834)
A. lemuringus Cope, 1861
A. liogaster Boulenger, 1905
A. macrinii Smith, 1968
A. matudai Smith, 1956
A. megapholidotus Smith, 1933
A. microlepidotus Davis, 1954
A. milleri Smith, 1950
A. naufragus Campbell, Hillis & Lamar, 1989
A. nebuloides Bocourt, 1873
A. nebulosus (Wiegmann, 1834)
A. omiltemanus Davis, 1954
A. parvicirculatus Alvarez del Toro & Smith, 1956
A. pentaprion Cope, 1862
A. petersi Bocourt, 1873
A. polyrhachis Smith, 1968
A. pygmaeus Alvarez del Toro & Smith, 1956
A. quercorum Fitch, 1978
A. rodriguezii Bocourt, 1873
A. sagrei Duméril & Bibron, 1837
A. schiedei (Wiegmann, 1834)
A. schmidti Smith, 1939
A. sericeus Hallowell, 1856
A. serranoi (Köhler, 1999)
A. simmonsii Holman, 1964
A. subocularis Davis, 1954

- A. taylori*** Smith & Spieler, 1945
A. tropidonotus Peters, 1863
A. uniformis Cope, 1885
A. utowanae Barbour, 1932
Familia Scincidae Gray, 1825 géneros: 5, especies: 26
Género *Eumeces* Wiegmann, 1834
E. altamirani Dugès, 1891
E. brevirostris (Günther, 1860)
E. colimensis Taylor, 1935
E. copei Taylor, 1933
E. dugesi Thomillot, 1883
E. gilberti Van Denburgh, 1896
E. lagunensis Van Denburgh, 1895
E. lynxe Wiegmann, 1834
E. multilineatus Tanner, 1957
E. multivirgatus (Hallowell, 1857)
E. obsoletus (Baird & Girard, 1852)
E. ochoterenae Taylor, 1933
E. parviauriculatus Taylor, 1933
E. parvulus Taylor, 1933
E. schwartzei Fischer, 1884
E. skiltonianus (Baird & Girard, 1852)
E. sumichrasti (Cope, 1866)
E. tetragrammus (Baird, 1858)
Género *Mesoscincus* Griffith, Ngo & Murphy, 2000
M. altamirani Dugès, 1891
M. schwartzei Fischer, 1884
Género *Scincella* Mittleman, 1950
S. gemmingeri (Cope, 1864)
S. lateralis (Say, 1823)
S. silvicola (Taylor, 1937)
Género *Sphenomorphus* Fitzinger, 1843
S. assatus (Cope, 1864)
S. cherriei (Cope, 1893)
S. incertum (Stuart, 1940)
Familia Teiidae Gray, 1827 géneros: 2, especies: 45
Género *Ameiva* Meyer, 1795
A. chaitzami Stuart, 1942
A. festiva (Lichtenstein & Von Martens, 1856)
A. undulata (Wiegmann, 1834)
Género *Aspidoscelis* Reeder, Cole & Dessauer, 2002
A. angusticeps (Cope, 1878)
A. bacatus (Van Denburgh & Slevin, 1921)
 Sinónimos
Aspidoscelis tigrisaethiops Cope, 1900
A. burti (Taylor, 1938)
A. calidipes (Duellman, 1955)
A. canus (Van Denburgh & Slevin, 1921)
 Sinónimos
Aspidoscelis tigris Baird & Girard, 1852
A. carmenensis (Maslin & Secoy, 1986)
A. catalinensis (Van Denburgh & Slevin, 1921)
A. celeripes (Dickerson, 1919)
 Sinónimos
Aspidoscelis tigrisrubidus Cope, 1892

- A. ceralbensis* (Van Denburgh & Slevin, 1921)
A. communis (Cope, 1878)
A. communis subsp. *mariarum* Günther, 1885
A. costata (Cope, 1878)
A. cozumela (Gadow, 1906)
A. cozumela subsp. *cozumela* Gadow, 1906
A. danheimae (Burt, 1929)
A. deppii (Wiegmann, 1834)
A. espiritensis (Van Denburgh & Slevin, 1921)
A. estebanensis (Dickerson, 1919)
 Sinónimos
Aspidoscelis tigrisgracilis (Van Denburgh & Slevin, 1921)
A. exsanguis (Lowe, 1956)
A. franciscensis (Van Denburgh & Slevin, 1921)
A. gularis (Baird & Girard, 1852)
A. guttata (Wiegmann, 1834)
A. guttata subsp. *immutabilis* Cope, 1878
A. hyperythra (Cope, 1863)
A. hyperythra subsp. *beldingi* Stejneger, 1894
A. hyperythra subsp. *hyperythra* Cope, 1863
A. hyperythra subsp. *schmidti* (Van Denburgh & Slevin, 1921)
A. inornata (Baird, 1859)
A. inornata subsp. *inornata* Baird, 1859
A. labialis (Stejneger, 1890)
A. laredoensis (McKinney, Kay & Anderson, 1973)
A. lineatissima (Cope, 1878)
A. lineatissima subsp. *lividia* Duellman & Wellman, 1960
A. martyrís (Stejneger, 1892)
A. maslini (Fritts, 1969)
A. maximus (Cope, 1863)
A. mexicana (Peters, 1870)
A. motaguae (Sackett, 1941)
A. neomexicana (Lowe & Zweifel, 1952)
A. opatae (Wright, 1967)
A. parvisocia (Zweifel, 1960)
A. picta (Van Denburgh & Slevin, 1921)
A. rodecki (McCoy & Maslin, 1962)
A. sacki (Wiegmann, 1834)
A. septemvittatus (Cope, 1892)
A. sexilineata (Linnaeus, 1766)
A. sonora (Lowe & Wright, 1964)
A. tessellata (Say, 1823)
A. tigris (Baird & Girard, 1852)
A. tigris subsp. *multiscutatus* Cope, 1892
A. tigris subsp. *vandenburghi* Dickerson, 1919
A. tigris subsp. *viduus* Walker, 1981
A. uniparens (Wright & Lowe, 1965)
 Familia Xantusiidae Baird, 1858
 Género *Lepidophyma* Duméril, 1851
L. chicoasensis Alvarez & Valentin, 1988
L. dontomasi Smith, 1942
L. flavimaculatum Duméril, 1851
L. gaigeae Mosauer, 1936
L. lineri Smith, 1973

géneros: 2, especies: 20

- L. lipetzi* Smith & Alvarez del Toro, 1977
L. lowei Bezy & Camarillo, 1997
L. micropholis Walker, 1955
L. occulor Smith, 1942
L. pajapanensis Werler, 1957
L. radula Smith, 1942
L. smithi Bocourt, 1876
L. sylvaticum Taylor, 1939
L. tarascae Bezy, Webb & Alvarez, 1982
L. tuxtlae Werler & Shannon, 1957
Género *Xantusia* Baird, 1858
X. bolsonae Webb, 1970
X. extorris Webb, 1965
X. henshawi Stejneger, 1893
X. sanchezi Bezy & Flores-Villela, 1999
X. vigilis Baird, 1858
Familia Xenosauridae Cope, 1866 géneros: 1, especies: 6
Género *Xenosaurus* Peters, 1861
X. grandis (Gray, 1856)
X. newmanorum Taylor, 1949
X. penai Pérez-Ramos, de la Riva & Campbell, 2000
X. phalaroanthereon Nieto-Montes de Oca, Campbell & Flores-Villela, 2001
X. platyceps King & Thompson, 1968
X. rectocollaris Smith & Iverson, 1993
Suborden Ambhisbaenia Gray, 1844
Familia Bipedidae Taylor, 1951 géneros: 1, especies: 3
Género *Bipes* de Lacepède, 1788
B. biporus (Cope, 1894)
B. canaliculatus Bonnaterre, 1789
B. tridactylus (Dugès, 1894)
Suborden Serpentes Linnaeus, 1758
Familia Boidae Gray, 1825 géneros: 2, especies: 2
Género *Boa* Linnaeus, 1758
B. constrictor (Linnaeus, 1758)
B. constrictor subsp. *imperator* Daudin, 1803
Género *Charina* Gray, 1849
C. trivirgata (Cope, 1861)
Sinónimos
Lichanura trivirgata Cope, 1861
C. trivirgata subsp. *roseofusca* (Cope, 1868)
C. trivirgata subsp. *saslowi* (Spiteri, 1987)
C. trivirgata subsp. *trivirgata* (Cope, 1861)
Familia Colubridae Opperl, 1811 géneros: 68, especies: 280
Género *Adelophis* Cope, 1879
A. copei Dugès, 1879
A. foxi Rossman & Blaney, 1968
Género *Adelphicos* Jan, 1862
A. latifasciatus Lynch & Smith, 1966
A. nigrilatus Smith, 1942
A. quadrvirgatum Jan, 1862
A. sargii Fischer, 1885
A. visoninus Cope, 1866
Género *Amastridium* Cope, 1861
A. veliferum Cope, 1861

- Género *Arizona* Kennicott, 1859
A. elegans Kennicott, 1859
A. pacata Klauber, 1946
- Género *Bogertophis* Dowling & Price, 1988
B. rosaliae (Mocquard, 1899)
B. subocularis (Brown, 1901)
- Género *Chersodromus* Reinhardt, 1860
C. liebmanni Reinhardt, 1860
C. rubriventris (Taylor, 1949)
- Género *Chilomeniscus* Cope, 1860
C. savagei Cliff, 1954
C. stramineus Cope, 1860
- Género *Chionactis* Cope, 1860
C. occipitalis (Hallowell, 1854)
C. palarostris (Klauber, 1937)
- Género *Clelia* Fitzinger, 1826
C. clelia (Daudin, 1803)
C. scytalina (Cope, 1867)
- Género *Coluber* Linnaeus, 1758
C. constrictor Linnaeus, 1758
- Género *Coniophanes* Cope, 1860
C. alvarezii Campbell, 1989
C. bipunctatus (Günther, 1858)
C. fissidens (Günther, 1858)
C. imperialis (Kennicott en Baird, 1859)
C. lateritius Cope, 1862
C. melanocephalus (Peters, 1869)
C. meridanus Schmidt & Andrews, 1936
C. piceivittis Cope, 1870
C. quinquevittatus (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
C. sarae Ponce-Campos & Smith, 2001
- Género *Conophis* Peters, 1860
C. lineatus (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
C. lineatus subsp. *concolor* (Cope, 1867)
C. morai Pérez-Higareda, López-Luna & Smith, 2002
C. pulcher Cope, 1869
C. vittatus Peters, 1860
- Género *Conopsis* Günther, 1858
C. biserialis Taylor & Smith, 1942
C. conica Taylor & Smith, 1942
C. lineata Kennicott, 1859
C. megalodon Taylor & Smith, 1942
C. nasus Günther, 1858
- Género *Cryophis* Bogert & Duellman, 1963
C. hallbergi Bogert & Duellman, 1963
- Género *Dendrophidion* Fitzinger, 1843
D. vinitor Smith, 1941
- Género *Diadophis* Baird & Girard, 1853
D. punctatus (Linnaeus, 1766)
- Género *Dipsas* Laurenti, 1768
D. brevifacies (Cope, 1866)
D. gaigeae (Oliver, 1937)
- Género *Dryadophis* Stuart, 1938
D. cliftoni Hardy, 1964

- D. melanolomus* (Cope, 1868)
D. melanolomus subsp. *veraecrucis* Stuart, 1941
 Género *Drymarchon* Fitzinger, 1843
D. corais (Boie, 1827)
D. melanurus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Género *Drymobius* Fitzinger, 1843
D. chloroticus (Cope, 1886)
D. margaritiferus (Schlegel, 1837)
 Género *Enulius* Cope, 1871
E. flavitorques (Cope, 1869)
E. oligostichus Smith, Arndt & Sherbrooke, 1967
 Género *Eridiphas* Leviton & Tanner, 1960
E. slevini (Tanner, 1943)
 Sinónimos
Eridiphas marcosensis Ottley & Tanner, 1978
 Género *Ficimia* Gray, 1849
F. hardyi Mendoza-Quijano & Smith, 1993
F. olivacea Gray, 1849
F. publia Cope, 1866
F. ramirezi Smith & Langebartel, 1950
F. ruspator Smith & Taylor, 1941
F. streckeri Taylor, 1931
F. variegata (Günther, 1858)
 Género *Geagras* Cope, 1876
G. redimitus Cope, 1876
 Género *Geophis* Wagler, 1830
G. anocularis Dunn, 1920
G. bicolor Gunther, 1868
G. blanchardi Taylor & Smith, 1939
G. cancellatus Smith, 1941
G. carinosus Stuart, 1941
G. chalybeus (Wagler, 1830)
G. dubius (Peters, 1861)
G. duellmani Smith & Holland, 1969
G. dugesii Bocourt, 1883
G. immaculatus Downs, 1967
G. incomptus Duellman, 1959
G. isthmicus (Boulenger, 1883)
G. juarezi Nieto-Montes de Oca, 2003
G. juliai Pérez-Higareda, Smith & López-Luna, 2001
G. laticinctus Smith & Williams, 1963
G. laticollaris Smith, Lynch & Altig, 1965
G. latifrontalis Garman, 1883
G. maculiferus Taylor, 1941
G. mutitorques (Cope, 1885)
G. nasalis (Cope, 1868)
G. nigrocinctus Duellman, 1959
G. omiltemanus Günther, 1893
G. petersii Boulenger, 1894
G. pyburni Campbell & Murphy, 1977
G. rhodogaster (Cope, 1868)
G. russatus Smith & Williams, 1966
G. sallaei Boulenger, 1894
G. semidoliatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

- G. sieboldi* (Jan, 1862)
G. tarascae Hartweg, 1959
Género *Gyalopion* Cope, 1860
G. canum Cope, 1860
G. quadrangulare (Günther, 1893)
Género *Heterodon* Latreille en Sonnini & Latreille, 1801
H. kennerlyi Kennicott, 1860
Género *Hypsiglena* Cope, 1860
H. gularis Tanner, 1954
H. torquata (Günther, 1860)
H. torquata subsp. *deserticola* Tanner, 1944
H. torquata subsp. *klauberi* Tanner, 1944
H. torquata subsp. *ochrorhyncha* Cope, 1860
Género *Imantodes* Duméril, 1853
I. cenchoa (Linnaeus, 1758)
I. gemmistratus Cope, 1861
I. tenuissimus Cope, 1866
Género *Lampropeltis* Fitzinger, 1843
L. alterna (Brown, 1901)
L. catalinensis Van Denburgh & Slevin, 1921
L. getula (Linnaeus, 1766)
L. herrerae Van Denburgh & Slevin, 1923
L. knoblochi Taylor, 1940
L. mexicana (Garman, 1884)
L. pyromelana (Cope, 1867)
L. ruthveni Blanchard, 1920
L. triangulum (Lacépède, 1788)
L. triangulum subsp. *polyzona* (Cope, 1860)
L. zonata (Lockington ex Blainville, 1835)
Género *Leptodeira* Fitzinger, 1843
L. annulata (Linnaeus, 1758)
L. frenata Cope, 1886
L. maculata (Hallowell, 1861)
L. nigrofasciata Günther, 1868
L. punctata (Peters, 1866)
L. septentrionalis Kennicott, 1859
L. splendida Günther, 1895
Género *Leptophis* Bell, 1825
L. ahaetulla (Linnaeus, 1758)
L. ahaetulla subsp. *praestans* (Cope, 1868)
L. diplotropis (Günther, 1872)
L. mexicanus Duméril, Bribon & Duméril, 1854
L. mexicanus subsp. *mexicanus* Duméril, Bribon & Duméril, 1854
L. modestus (Günther, 1872)
Género *Manolepis* Cope, 1885
M. putnami (Jan, 1863)
Género *Masticophis* Baird & Girard, 1853
M. anthonyi Stejneger, 1901
M. aurigulus (Cope, 1861)
M. barbouri Van Denburgh & Slevin, 1821
M. bilineatus Jan, 1863
M. flagellum (Shaw, 1802)
M. fuliginosus (Cope, 1895)
M. lateralis (Hallowell, 1853)

- M. mentovarius* (Duméril, Briçon & Duméril, 1854)
M. mentovarius subsp. *mentovarius* (Duméril, Briçon & Duméril, 1854)
M. schotti Baird & Girard, 1853
M. slevini Lowe & Norris, 1955
M. taeniatus (Hallowell, 1852)
Género *Nerodia* Baird & Girard, 1853
N. erythrogaster (Forster, 1771)
N. rhombifer (Hallowell, 1852)
Género *Ninia* Baird & Girard, 1853
N. diademata Baird & Girard, 1853
N. sebae (Duméril, Briçon & Duméril, 1854)
Género *Opheodrys* Fitzinger, 1843
O. aestivus (Linnaeus, 1766)
O. vernalis (Harlan, 1827)
Género *Oxybelis* Wagler, 1830
O. aeneus (Wagler, 1824)
O. fulgidus (Daudin, 1803)
Género *Oxyrhopus* Wagler, 1830
O. petola (Linnaeus, 1758)
Género *Pantherophis* Fitzinger, 1843
P. bairdi Yarrow, 1880
P. guttatus Linnaeus, 1766
Género *Phyllorhynchus* Stejneger, 1890
P. browni Stejneger, 1890
P. decurtatus (Cope, 1868)
Género *Pituophis* Holbrook, 1842
P. catenifer Blainville, 1835
P. depei (Duméril, 1853)
P. insulanus (Klauber, 1946)
P. lineaticollis (Cope, 1861)
P. melanoleucus Daudin, 1803
P. vertebralis Blainville, 1835
Género *Pliocercus* Cope, 1860
P. andrewsi Smith, 1942
P. bicolor Smith, 1941
P. elapoides Cope, 1860
P. wilmarai Smith, Pérez-Higareda & Chiszar, 1996
Género *Pseudelaphe* Mertens & Rosenberg, 1943
P. flavirufa Cope, 1867
P. phaescens Dowling, 1952
P. uribei Ramírez-Bautista & Smith, 1992
Género *Pseudoficimia* Bocourt, 1883
P. frontalis (Cope, 1864)
Género *Pseudoleptodeira* Taylor, 1938
P. latifasciata (Günther, 1894)
P. uribei Ramírez-Bautista & Smith, 1992
Género *Pseustes* Fitzinger, 1843
P. poecilonotus (Günther, 1858)
Género *Rhadinaea* Cope, 1863
R. bogertorum Myers, 1974
R. cuneata Myers, 1974
R. decorata (Günther, 1858)
R. forbesi Smith, 1942
R. fulvivittis Cope, 1875

- R. gaigeae* Bailey, 1937
R. godmani (Günther, 1865)
R. hannsteini (Stuart, 1949)
R. hesperia Bailey, 1940
R. kanalchutchan Mendelson III & D. A. Kizirian, 1995
R. kinkelini Boettger, 1898
R. lachrymans (Cope, 1869)
R. laureata (Günther, 1868)
R. macdougalli Smith & Langebartel, 1950
R. marcellae Taylor, 1949
R. montana Smith, 1944
R. myersi Rossman, 1965
R. omitemana (Günther, 1894)
R. posadasii (Slevin, 1936)
R. quinquelineata Cope, 1886
R. schistosa (Smith, 1941)
R. taeniata (Peters, 1863)
Género *Rhadinophanes* Myers & Campbell, 1981
R. monticola Myers & Campbell, 1981
Género *Rhinocheilus* Baird & Girard, 1853
R. etheridgei Grismer, 1990
R. lecontei Baird & Girard, 1853
Género *Salvadora* Baird & Girard, 1853
S. bairdi Jan, 1860
S. deserticola Schmidt, 1940
S. grahamiae Baird & Girard, 1853
S. hexalepis (Cope, 1866)
S. intermedia Hartweg, 1940
S. lemniscata (Cope, 1890)
S. mexicana (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
Género *Scaphiodontophis* Taylor & Smith, 1943
S. annulatus (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
Género *Senticolis* Dowling & Fries, 1987
S. triaspis (Cope, 1866)
Género *Sibon* Fitzinger, 1826
S. dimidiata (Günther, 1872)
S. linearis Pérez-Higareda, López-Luna & Smith, 2002
S. nebulata (Linnaeus, 1758)
S. sanniola (Cope, 1866)
Género *Sonora* Baird & Girard, 1853
S. aemula (Cope, 1879)
S. michoacanensis Dugès, 1884
S. semiannulata Baird & Girard, 1853
Género *Spilotes* Wagler, 1830
S. pullatus (Linnaeus, 1758)
Género *Stenorrhina* Duméril, 1853
S. degenhardtii Berthold, 1846
S. freminvillei Duméril, Bribon & Duméril, 1854
Género *Storeria* Baird & Girard, 1853
S. dekayi (Holbrook, 1842)
S. hidalgoensis Taylor, 1942
S. storerioides (Cope, 1865)
Género *Symphimus* Cope, 1869
S. leucostomus Cope, 1869

- S. mayae* (Gaige, 1936)
 Género *Sympholis* Cope, 1862
S. lippiens Cope, 1862
 Género *Tantalophis* Duellman, 1958
T. discolor (Günther, 1860)
 Género *Tantilla* Baird & Girard, 1853
T. atriceps (Günther, 1895)
T. bocourti (Günther, 1895)
T. briggsi Savitzky & Smith, 1971
T. calamarina Cope, 1866
T. cascadae Wilson & Meyer, 1981
T. coronadoi Hartweg, 1944
T. cuniculator Smith, 1939
T. deppei (Bocourt, 1883)
T. flavilineata Smith & Burger, 1950
T. gracilis Baird & Girard, 1853
T. hobartsmithi Taylor, 1937
T. impensa Campbell, 1998
T. jani (Günther, 1895)
T. johnsoni Wilson, Vaughan & Dixon, 1999
T. moesta (Günther, 1863)
T. nigriceps Kennicott, 1860
T. oaxacae Wilson & Meyer, 1971
T. planiceps (Blainville, 1835)
T. robusta Canseco-Márquez, Mendelson III & Gutiérrez-Mayén, 2002
T. rubra Cope, 1876
T. schistosa (Bocourt, 1883)
T. sertula Wilson & Campbell, 2000
T. shawi Taylor, 1949
T. slavensi Pérez-Higareda, Smith & Smith, 1985
T. striata Dunn, 1928
T. tayrae Wilson, 1983
T. triseriata Smith & Smith, 1951
T. vulcani Campbell, 1998
T. wilcoxi Stejneger, 1902
T. yaquia Smith, 1942
 Género *Tantillita* Smith, 1941
T. brevissima (Taylor, 1937)
T. canula Cope, 1875
T. lintoni (Smith, 1940)
 Género *Thamnophis* Fitzinger, 1843
T. chrysocephalus (Cope, 1885)
T. cyrtopsis (Kennicott, 1860)
T. elegans (Baird & Girard, 1853)
T. eques (Reuss, 1834)
T. errans Smith, 1942
T. exsul Rossman, 1969
T. fulvus (Bocourt, 1893)
T. godmani (Günther, 1894)
T. hammondi (Kennicott, 1860)
T. marcianus (Baird & Girard, 1853)
T. melanogaster (Peters, 1864)
T. mendax Walker, 1955
T. nigronuchalis Thompson, 1957

- T. postremus* Smith, 1942
T. proximus (Say, 1823)
T. pulchrilatus (Cope, 1885)
T. rossmani Conant, 2000
T. rufipunctatus Cope, 1875
T. scalaris Cope, 1861
T. scaliger (Jan, 1863)
T. sirtalis (Linnaeus, 1758)
T. sumichrasti (Cope, 1866)
T. valida (Kennicott, 1860)
 Género *Tretanorhinus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854
T. nigroluteus Cope, 1861
 Género *Trimorphodon* Cope, 1869
T. wilkinsonii Cope, 1886
 Género *Tropidodipsas* Günther, 1858
T. annulifera Boulenger, 1894
T. fasciata Günther, 1858
T. fischeri (Boulenger, 1894)
T. philippii (Jan, 1863)
T. sartorii Cope, 1863
T. wilkinsonii Cope, 1886
T. zweifeli Liner & Wilson, 1970
 Género *Xenodon* Boie, 1826
X. rabdocephalus (Wied, 1824)
 Familia Elapidae Boie, 1827 géneros: 3, especies: 17
 Género *Micruroides* Schmidt, 1928
M. euryxanthus (Kennicott, 1860)
 Género *Micrurus* Wagler, 1824
M. bernadi Cope, 1887
M. bogerti Roze, 1967
M. browni Schmidt & Smith, 1943
M. diastema (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
M. distans (Kennicott, 1860)
M. elegans (Jan, 1858)
M. ephippifer (Cope, 1886)
M. fulvius (Linnaeus, 1766)
M. laticollaris (Peters, 1869)
M. latifasciatus Schmidt, 1933
M. limbatus Fraser, 1964
M. nebularis Roze, 1989
M. nigrocinctus (Girard, 1854)
M. pachecogili Campbell, 2000
M. proximans Smith & Chrapliwy, 1958
 Género *Pelamis* Daudin, 1803
P. platurus (Linnaeus, 1766)
 Familia Leptotyphlopidae Stejneger, 1892 géneros: 1, especies: 7
 Género *Leptotyphlops* Fitzinger, 1843
L. bressoni Taylor, 1939
L. dissectus Cope, 1896
L. dulcis (Baird & Girard, 1853)
L. dulcis subsp. *dulcis* (Baird & Girard, 1853)
L. goudotii Duméril & Bibron, 1844
L. goudotii subsp. *pheops* (Cope, 1876)
L. humilis (Baird & Girard, 1853)

- L. humilis* subsp. *boettgeri* (Werner, 1899)
L. humilis subsp. *cahuilae* Klauber, 1931
L. humilis subsp. *chihuahuaensis* Tanner, 1885
L. humilis subsp. *levitoni* Murphy, 1975
L. humilis subsp. *lindsayi* Murphy, 1975
L. maximus Loveridge, 1932
L. myopicus Garman, 1883
 Familia Loxocemidae Cope, 1861 géneros: 1, especies: 1
 Género *Loxocemus* Cope, 1861
L. bicolor Cope, 1861
 Familia Tropicopidae géneros: 2, especies: 2
 Género *Exiliboa* Bogert, 1968
E. placata Bogert, 1968
 Género *Ungaliophis* Müller, 1882
U. continentalis Müller, 1882
 Familia Typhlopidae Merrem, 1820 géneros: 2, especies: 2
 Género *Ramphotyphlops* Fitzinger, 1843
R. braminus (Daudin, 1803)
 Género *Typhlops* Oppel, 1811
T. microstomus Cope, 1866
 Familia Viperidae Oppel, 1811 géneros: 9, especies: 51
 Género *Agkistrodon* de Beauvois, 1799
A. bilineatus Günther, 1863
A. contortrix (Linnaeus, 1766)
A. taylori Burger & Robertson, 1951
 Género *Atropoides* Werman, 1992
A. nummifer (Rüppell, 1845)
A. olmec (Pérez-Higareda, Smith & Juliá-Zertuche, 1985)
 Género *Bothriechis* Peters, 1859
B. aurifer (Salvin, 1860)
B. bicolor (Bocourt, 1868)
B. rowleyi (Bogert, 1968)
B. schlegeli (Berthold, 1846)
 Género *Bothrops* Spix & Martius, 1823
B. asper (Garman, 1883)
 Género *Cerrophidion* Campbell & Lamar 1992
C. barbouri (Dunn, 1919)
C. godmani (Günther, 1863)
C. petlalcalensis López-Luna, Vogt & Torre-Loranca, 1999
C. tzotzilorum (Campbell, 1985)
 Género *Crotalus* Linnaeus, 1758
C. angelensis Klauber, 1963
C. aquilus Klauber, 1952
C. atrox Baird & Girard, 1853
C. basiliscus (Cope, 1864)
C. catalinensis Cliff, 1954
C. cerastes Hallowell, 1854
C. durissus Linnaeus, 1758
C. enyo (Cope, 1861)
C. enyo subsp. *cerralvensis* Cliff, 1954
C. enyo subsp. *enyoy* (Cope, 1861)
C. enyo subsp. *furvus* Lowe & Norris, 1954
C. estebanensis Klauber, 1949
C. intermedius Troschel en Müller, 1865

C. lannomi Tanner, 1966
C. lepidus (Kennicott, 1861)
C. lorenzoensis Radcliffe & Maslin, 1975
C. mitchellii (Cope, 1861)
C. mitchellii subsp. *mitchellii* (Cope, 1861)
C. mitchellii subsp. *pyrrhus* (Cope, 1867)
C. molossus Baird & Girard, 1853
C. muertensis Klauber, 1949
C. oreganus Holbrook, 1840
C. oreganus subsp. *caliginis* Klauber, 1949
C. polystictus (Cope, 1865)
C. pricei Van Denburgh, 1895
C. pusillus Klauber, 1952
C. ravus Cope, 1865
C. ruber Cope, 1892

Sinónimos

Crotalus exsul Garman, 1883

C. ruber subsp. *lucasensis* Van Denburgh, 1920
C. ruber subsp. *ruber* Cope, 1892
C. scutulatus (Kennicott, 1861)
C. stejnegeri Dunn, 1919
C. tigris Kennicott, 1859
C. tortugensis Van Denburgh & Slevin, 1921
C. transversus Taylor, 1944
C. triseriatus (Wagler, 1830)
C. viridis Rafinesque, 1818
C. willardi Meek, 1905

Género ***Ophryacus*** Cope, 1887

O. melanurum Müller, 1923
O. undulatus (Jan, 1859)

Género ***Porthidium*** Cope, 1871

P. dunnii (Hartweg & Oliver, 1938)
P. hespere Campbell, 1976
P. nasutum (Bocourt, 1868)
P. yucatanicum (Smith, 1941)

Género ***Sistrurus*** Garman, 1883

S. catenatus (Rafinesque, 1818)

Orden Testudines Linnaeus, 1758

Familia Bataguridae

Género ***Rhinoclemmys*** Fitzinger, 1835

R. areolata (Duméril & Bribon, 1851)
R. pulcherrima (Gray, 1855)
R. rubida (Cope, 1870)

géneros: 1, especies: 3

Familia Cheloniidae Oppel, 1811

Género ***Caretta*** Rafinesque, 1814

C. caretta (Linnaeus, 1758)
C. caretta subsp. *gigas* Deraniyagala, 1933

géneros: 4, especies: 5

Género ***Chelonia*** Brongniart, 1800

C. mydas (Linnaeus, 1758)

Género ***Eretmochelys*** Fitzinger, 1843

E. imbricata (Linnaeus, 1766)

Género ***Lepidochelys*** Fitzinger, 1843

L. kempii (Garman, 1880)

L. olivacea (Eschscholtz, 1829)

<p>Familia Chelydridae Swainson, 1839 Género <i>Chelydra</i> Schweigger, 1812 <i>C. serpentina</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>géneros: 1, especies: 1</p>
<p>Familia Dermatemydidae Gray, 1870 Género <i>Dermatemys</i> Gray, 1847 <i>D. mawii</i> Gray, 1847</p>	<p>géneros: 1, especies: 1</p>
<p>Familia Dermochelyidae Fitzinger, 1843 Género <i>Dermochelys</i> Blainville, 1816 <i>D. coriacea</i> (Vandelli, 1761) Sinónimos <i>Dermochelys coriaceaschlegelii</i> (Garman, 1884)</p>	<p>géneros: 1, especies: 1</p>
<p>Familia Emydidae Rafinesque, 1815 Género <i>Chrysemys</i> Gray, 1844 <i>C. picta</i> (Schneider, 1783) Género <i>Pseudemys</i> Gray, 1855 <i>P. gorzugi</i> Ward, 1984 Género <i>Terrapene</i> Merrem, 1820 <i>T. carolina</i> (Linnaeus, 1758) <i>T. coahuila</i> Schmidt & Owens, 1944 <i>T. nelsoni</i> Stejneger, 1925 <i>T. ornata</i> (Agassiz, 1857) Género <i>Trachemys</i> Agassiz, 1857 <i>T. gaigeae</i> Hartweg, 1939 <i>T. nebulosa</i> Van Denburgh, 1895 <i>T. ornata</i> Gray, 1831 <i>T. scripta</i> (Schoepf, 1792) <i>T. taylori</i> Legler, 1960 <i>T. venusta</i> Gray, 1855 <i>T. yaquia</i> Legler & Webb, 1970</p>	<p>géneros: 4, especies: 13</p>
<p>Familia Kinosternidae Agassiz, 1857 Género <i>Claudius</i> Cope, 1865 <i>C. angustatus</i> Cope, 1865 Género <i>Kinosternon</i> Spix, 1824 <i>K. acutum</i> Gray, 1831 <i>K. alamosae</i> Berry & Legler, 1980 <i>K. arizonense</i> Gilmore, 1922 <i>K. chimalhuaca</i> Berry, Siedel & Iverson, 1997 <i>K. creaseri</i> Hartweg, 1934 <i>K. durangoense</i> Iverson, 1979 <i>K. flavescens</i> (Agassiz, 1857) <i>K. herrerae</i> Stejneger, 1925 <i>K. hirtipes</i> Wagler, 1830 <i>K. integrum</i> Le Conte, 1854 <i>K. leucostomum</i> (Duméril & Bribon, 1851) <i>K. oaxacae</i> Berry & Iverson, 1980 <i>K. scorpioides</i> (Linnaeus, 1766) <i>K. sonoriense</i> Le Conte, 1854 Género <i>Staurotypus</i> Wagler, 1830 <i>S. salvini</i> Gray, 1864 <i>S. triporcatus</i> (Wiegmann, 1828)</p>	<p>géneros: 3, especies: 17</p>
<p>Familia Testudinidae Batsch, 1788 Género <i>Gopherus</i> Rafinesque, 1832 <i>G. agassizii</i> (Cooper, 1863) <i>G. berlandieri</i> (Agassiz, 1857)</p>	<p>géneros: 1, especies: 3</p>

***G. flavomarginatus* Legler, 1959**
Familia Trionychidae Fitzinger, 1826
Género *Apalone* Rafinesque, 1832
***A. ater* (Webb & Legler, 1960)**
***A. spinifera* (Le Sueur, 1827)**

géneros: 1, especies: 2

Referencias

- Flores-Villela, O. 1993. *Herpetofauna Mexicana. Lista anotada de las especies de anfibios y reptiles de México, cambios taxonómicos recientes y nuevas especies* Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh.
- Flores-Villela, O. y L. Canseco-Márquez. 2004. Nuevas especies y cambios taxonómicos para la herpetofauna de México *Acta Zool.Mex.* 20:115-144.
- Flores-Villela, O. y L. Canseco-Márquez. 2008. Actualización del catálogo de autoridad taxonómica de la herpetofauna de México. Museo de Zoología, Fac. de Ciencias, UNAM. Base de datos SNIB-CONABIO, proyecto CS003 (en seguimiento).
- Liner, Ernest A. 2007. A checklist of the Amphibians and Reptiles of México. *Occasional Papers of the Museum of Natural Science.* (80): 1-60.