

Patrones de distribución de las especies de boragináceas presentes en el estado de Campeche

Ma. Goreti Campos Ríos

Patrón de distribución	Especie
Antillanas	<i>Cordia sebestena</i> (ciricote blanco, zac-copte) <i>Tournefortia gnaphalodes</i> (sikimay)
Sur de México y Centroamérica	<i>Bourreria mollis</i> <i>Cordia obliqua</i> <i>Cordia diversifolia</i> <i>Cordia stellifera</i> <i>Cordia stenoclada</i> <i>Heliotropium fruticosum</i> <i>Heliotropium pringlei</i> (kambal sahum) <i>Rochefortia lundellii</i> <i>Tournefortia acutiflora</i> <i>Tournefortia belizensis</i> <i>Tournefortia elongata</i> <i>Tournefortia hartwegii</i> <i>Tournefortia hirsutissima</i> <i>Tournefortia maculata</i> <i>Tournefortia umbellata</i> <i>Varronia inermis</i>

Mesoamerica al N de Sudamerida	<p><i>Cordia alliodora</i> (bojon prieto o bohóm)</p> <p><i>Cordia dentata</i> (zazamil)</p> <p><i>Cordia gerascanthus</i> (bohóm)</p> <p><i>Ehertia tinifolia</i> (roble, beek)</p> <p><i>Hliotropium angiospermum</i> (cola de alacrán, ne' maax)</p> <p><i>Heliotropium curassavicum</i> (cola de gato, sinan xiw)</p> <p><i>Heliotropium indicum</i> (cola de alacrán, toksis)</p> <p><i>Heliotropium procumbens</i> ne ' miis, x' taway)</p> <p><i>Heliotropium ternatum</i> (cola de alacrán, toksis)</p> <p><i>Tournefortia glabra</i> (ne sinam)</p> <p><i>Tournefortia volubilis</i> (bejuco de mico, yaaxak, xbe kak, bek ak')</p> <p><i>Varronia bullata</i> (orégano silvestre, nich-mas)</p> <p><i>Varronia curassavica</i> (k'o peche, nemaax, ich cho'o)</p> <p><i>Varronia globosa</i> (orégano)</p> <p><i>Varronia spinescens</i></p>
Endémicas de la Península de Yucatán	<p><i>Bourreria pulchra</i> (bacalche)</p> <p><i>Cordia dodecandra</i> (ciricote, chakopté, k'an-k'opt'e")</p>